

Az intravénás kábítószer-használók HIV,  
HBV, HCV prevalenciája a 2012-es  
folyamatos adatgyűjtés alapján

Dr. Dudás Mária, Országos Epidemiológiai Központ, Járványügyi osztály

# A 2012. évi adatgyűjtésben részt vett szervezetek

---

## ▶ **Tűcsere szervezetek**

Artéra (7), Baptista Szeretetszolgálat (17), Debrecen tűcsere (15), DPA (70), Kecskemét (8), Kék Pont (14), Salgótarján (8), Szekszárd (4), Válaszút Misszió (21)

## ▶ **Drogambulanciák**

Debreceni drogambulancia (6), Nyírő (46), Soroksár (77) (minták 34%-a drogambulanciáktól származott)

## ▶ **Tűcsere+drogambulancia**

Gyula (6), Pécs (33), Szeged (47)

---



# A 2012. év folyamán vizsgált intravénás kábítószer- használók

## HIV, HCV, HBV fertőzöttsége korcsoportok szerint

Korcsoport		HIV ellenanyag jelenlétére vizsgált személyek		HBsAg antigén jelenlétére vizsgált személyek			HCV ellenanyag jelenlétére vizsgált személyek		
		száma	közül pozitív	száma	közül pozitív		száma	közül pozitív	
					szám	%		Szám	%
<b>&lt; 25 év</b>	férfi	28	0	28	0	0	24	2	8,3
	nő	31	0	31	0	0	28	5	17,9
<b>25-34 év</b>	férfi	121	0	122	0	0	118	23	19,5
	nő	55	0	56	0	0	50	15	30
<b>&gt; 34 év</b>	férfi	100	0	100	2	2	98	24	24,5
	nő	41	0	41	1	2,4	36	13	36,1
<b>Összesen</b>	<b>férfi</b>	249	0	250	2	0,8	240	49	20,4
	<b>nő</b>	127	0	128	1	0,8	114	33	28,9
	<b>ffi+nő</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>378</b>	<b>3</b>	<b>0,8</b>	<b>354</b>	<b>82</b>	<b>23,2</b>



**A HCV, HBV pozitív intravénás kábítószer-használók  
megoszlása  
az intravénás kábítószer-használat kezdete szerint, 2012**

Az intravénás kábitószer- használat kezdete	HBsAg antigén jelenlétére vizsgált személyek			HCV ellenanyag jelenlétére vizsgált személyek		
	száma	közül pozitív		száma	közül pozitív	
		szám	%		szám	%
<b>&lt; 2 év</b>	36	0	0	30	3	10
<b>2 - 4 év</b>	62	0	0	60	15	25
<b>5 - 9 év</b>	58	0	0	51	10	19,6
<b>10 évnél régebben</b>	208	3	1,4	199	52	26,1
<b>Nem tudja</b>	13	0	0	13	0	0
<b>Összesen</b>	<b>377</b>	<b>3</b>	<b>0,8</b>	<b>353</b>	<b>80</b>	<b>22,7</b>

## A HCV, HBV pozitív intravénás kábítószer-használók megoszlása az utolsó injektlás időpontja szerint, 2012

Az utolsó injektlás időpontja	HBsAg antigén jelenlétére vizsgált személyek			HCV ellenanyag jelenlétére vizsgált személyek		
	száma	közül pozitív		száma	közül pozitív	
		szám	%		szám	%
<b>&lt; 4 hét</b>	171	2	1,2	156	48	30,8
<b>4 hét-1 év</b>	92	1	1,1	86	15	17,4
<b>&gt; 1év</b>	95	0	0	93	14	15,1
<b>Nem tudja</b>	19	0	0	18	3	16,7
<b>Összesen</b>	<b>377</b>	<b>3</b>	<b>0,8</b>	<b>353</b>	<b>80</b>	<b>22,7</b>

## A HBV és a HCV szűrővizsgálatok száma és a pozitívak aránya területenként, 2012


Terület/város	HBsAg antigén jelenlétére vizsgált személyek			HCV ellenanyag jelenlétére vizsgált személyek		
	száma	közül pozitív		száma	közül pozitív	
		szám	%		szám	%
<b>Budapest</b>	252	3	1,2	235	64	27,2
<b>Debrecen</b>	21	0	0	20	8	40
<b>Gyula</b>	6	0	0	6	1	16,7
<b>Kecskemét</b>	8	0	0	8	0	0
<b>Pécs</b>	33	0	0	31	2	6,5
<b>Salgótarján</b>	8	0	0	8	0	0
<b>Szeged</b>	47	0	0	43	7	16,3
<b>Szekszárd</b>	4	0	0	4	0	0
<b>Vidék összesen</b>	127	0	0	120	18	15
<b>Együtt</b>	<b>379</b>	<b>3</b>	<b>0,8</b>	<b>355</b>	<b>82</b>	<b>23,1</b>

**A HCV, HBV pozitív intravénás kábítószer-használók  
megoszlása az elsődlegesen injektált kábítószer típusa  
szerint, 2012**

<b>Kábítószer típusa</b>	<b>HBsAg antigén jelenlétére vizsgált személyek</b>			<b>HCV ellenanyag jelenlétére vizsgált személyek</b>		
	<b>száma</b>	<b>közül pozitív</b>		<b>száma</b>	<b>közül pozitív</b>	
		<b>szám</b>	<b>%</b>		<b>szám</b>	<b>%</b>
<b>Opiát</b>	175	2	1,1	169	37	21,9
<b>Amfetamin</b>	104	0	0	96	18	18,8
<b>Kokain</b>	7	0	0	7	2	28,6
<b>Egyéb</b>	92	1	1,1	82	25	30,5
<b>Együtt</b>	<b>378</b>	<b>3</b>	<b>0,8</b>	<b>354</b>	<b>82</b>	<b>23,2</b>

# HCV prevalencia az injektált szerek szerinti bontásban, 2010-2012

HCV prevalencia





# HIV szűrővizsgálatra vonatkozó kérdések

- ▶ A kliensek 70%-ánál már történt HIV szűrővizsgálat a múltban



90%-uk tudta, hogy HIV negatív

5%-nál 2012-ben

44%-nál 2011-ben

25%-nál 2010-ben

történt utoljára HIV szűrővizsgálat



**A vizsgálatba bevontak felénél az utolsó HIV szűrővizsgálat két évnél régebben történt.**



# HCV szűrővizsgálatra vonatkozó kérdések (1)

- ▶ A kliensek 70%-ánál már történt HCV szűrővizsgálat.



4%-nál 2012-ben  
45%-nál 2011-ben  
24%-nál 2010-ben  
történt utoljára HCV szűrővizsgálat



**A vizsgálatba bevontak 45%-ánál  
az utolsó HCV szűrővizsgálat két évnél  
régebben történt.**



## HCV szűrővizsgálatra vonatkozó kérdések (2)

A múltban HCV szűrővizsgálaton részt vett kliensek 77%-a (200 fő) negatívnak vallotta magát HCV-re nézve.



Azonban 17%-uk (34 fő) HCV ellenanyag pozitívnak bizonyult.

30 fő vallotta magát HCV pozitívnak, 22 főnél ez bizonyítást is nyert.

**Azoknak, akik voltak szűrővizsgálaton, de nem tudták a szerostátuszukat, egyharmaduk volt HCV ellenanyag pozitív.**





Köszönöm a figyelmet!

