

Az intravénás kábítószer-használók
HIV, HBV, HCV prevalenciája a 2013-es
folyamatos adatgyűjtés alapján

Dr. Dudás Mária, Országos Epidemiológiai Központ, Járványügyi osztály

A 2013. évi adatgyűjtésben részt vett szervezetek (összesen 202 minta)

▶ **Tűcsere szervezetek**

Artéra (20), Baptista Szeretetszolgálat (19), Debrecen tűcsere (23), DPA (23), Kecskemét (1), Salgótarján (1), Szekszárd (2), Válaszút Misszió (11)

▶ **Drogambulanciák**

Debreceni drogambulancia (2), Nyírő (30), Soroksár (20), Veszprém (1) (minták 26%-a drogambulanciáktól származott)

▶ **Tűcsere+drogambulancia**

Pécs (22), Szeged (18)




A 2013. év folyamán vizsgált intravénás kábítószer- használók

HIV, HCV, HBV fertőzöttsége korcsoportok, nemek szerint

Korcsoport		HIV ellenanyag jelenlétére vizsgált személyek		HBsAg antigén jelenlétére vizsgált személyek			HCV ellenanyag jelenlétére vizsgált személyek		
		száma	közül pozitív	száma	közül pozitív		száma	közül pozitív	
					szám	%		Szám	%
< 25 év	férfi	20	0	20	0	0	19	4	21
	nő	14	0	14	0	0	28	6	21,4
25-34 év	férfi	49	0	49	0	0	46	14	30,4
	nő	30	0	30	0	0	14	5	35,7
> 34 év	férfi	70	0	70	3	4,2	67	20	29,9
	nő	19	0	19	0	0	16	3	18,8
Összesen	férfi	139	0	139	3	2,2	132	38	28,8
	nő	63	0	63	0	0	58	14	24,1
	ffi+nő	202	0	202	3	1,5	190	52	27,4



Az intravénás kábítószer-használók HIV, HBV, HCV prevalenciája a folyamatos adatgyűjtés alapján 2010-2013



**A HCV, HBV pozitív intravénás kábítószer-használók
megoszlása
az intravénás kábítószer-használat kezdete szerint, 2013**

Az intravénás kábitószer- használat kezdete	HBsAg antigén jelenlétére vizsgált személyek			HCV ellenanyag jelenlétére vizsgált személyek		
	száma	közül pozitív		száma	közül pozitív	
		szám	%		szám	%
< 2 év	23	1	4,3	22	8	36,4
2 - 4 év	33	0	0	32	11	34,4
5 - 9 év	27	0	0	25	7	28
10 évnél régebben	108	2	1,9	100	25	25
Nem tudja	9	0	0	9	0	0
Összesen	200*	3	1,5	188	51	27,1

▶ * 2 mintánál hiányzott az adat erre a változóra vonatkoztatva

A HCV, HBV pozitív intravénás kábítószer-használók megoszlása az utolsó injektlás időpontja szerint, 2013

Az utolsó injektlás időpontja	HBsAg antigén jelenlétére vizsgált személyek			HCV ellenanyag jelenlétére vizsgált személyek		
	száma	közül pozitív		száma	közül pozitív	
		szám	%		szám	%
< 4 hét	115	3	2,6	107	40	37,4
4 hét-1 év	41	0	0	39	9	23,1
> 1év	30	0	0	29	3	10,3
Nem tudja	14	0	0	13	0	0
Összesen	200*	3	1,5	188	52	27,7

▶ * 2 mintánál hiányzott az adat erre a változóra vonatkoztatva

A HBV és a HCV szűrővizsgálatok száma és a pozitívak aránya területenként, 2013

Terület/város	HBsAg antigén jelenlétére vizsgált személyek			HCV ellenanyag jelenlétére vizsgált személyek		
	száma	közül pozitív		száma	közül pozitív	
		szám	%		szám	%
Budapest	123	3	2,4	114	40	35,1
Debrecen	25	0	0	23	6	26,1
Eger	9	0	0	8	2	25
Kecskemét	1	0	0	1	0	0
Pécs	22	0	0	22	1	4,5
Salgótarján	1	0	0	1	0	0
Szeged	18	0	0	18	3	16,7
Szekszárd	2	0	0	2	0	0
Veszprém	1	0	0	1	0	0
Vidék összesen	79	0	0	76	12	15,8
Együtt	202	3	1,5	190	52	27,4


A HCV, HBV pozitív intravénás kábítószer-használók megoszlása az elsődlegesen injektált kábítószer típusa szerint, 2013

Kábítószer típusa	HBsAg antigén jelenlétére vizsgált személyek			HCV ellenanyag jelenlétére vizsgált személyek		
	száma	közül pozitív		száma	közül pozitív	
		szám	%		szám	%
Opiát	76	1	1,3	70	16	22,9
Amfetamin	50	0	0	49	7	14,3
Kokain	1	0	0	0	0	0
Egyéb	74	2	2,7	70	29	41,4
Együtt	201*	3	1,5	189	52	27,5

▶ * I mintánál hiányzott az adat erre a változóra vonatkoztatva

HCV prevalencia az injektált szerek szerinti bontásban, 2010-2013

HCV prevalencia



HIV szűrővizsgálatra vonatkozó kérdések

- ▶ A kliensek 70%-ánál már történt HIV szűrővizsgálat a múltban



84%-uk tudta, hogy HIV negatív (140 kliens)

118 kliensnél volt érdemi válasz az időpontra
4,2%-nál 2013-ban
40,7%-nál 2012-ben
történt utoljára HIV szűrővizsgálat



A vizsgálatba bevontak több mint felénél az utolsó HIV szűrővizsgálat két évnél régebben történt.



HCV szűrővizsgálatra vonatkozó kérdések (1)

- ▶ A kliensek 68%-ánál már történt HCV szűrővizsgálat (138).



114 főnél volt érdemi válasz az időpontra
4,3%-nál 2013-ben
42%-nál 2011-ben
történt utoljára HCV szűrővizsgálat



**A vizsgálatba bevontak több mint felénél
az utolsó HCV szűrővizsgálat két évnél
régebben történt.**



HCV szűrővizsgálatra vonatkozó kérdések (2)

A múltban HCV szűrővizsgálaton részt vett kliensek 77%-a (106 fő) negatívnak vallotta magát HCV-re nézve.



Azonban 20%-uk (22 fő) HCV ellenanyag pozitívnak bizonyult.

10 fő vallotta magát HCV pozitívnak, 9 főnél ez bizonyítást is nyert.

Azoknak, akik voltak szűrővizsgálaton, de nem tudták a szerostátuszukat(22), egyharmaduk volt HCV ellenanyag pozitív.





Köszönöm a figyelmet!

