

Intravénás szerhasználati mintázatok, kockázati magatartások és a HCV fertőzöttség


Az Országos Epidemiológiai Központ által koordinált 2012. évi
HIV/HBV/HCV szűrővizsgálatok előzetes adatai

Tarján Anna
Nemzeti Drog Fókuszpont
2013. Március 18.



Drog, Adat, Döntés


Az elsődlegesen injektált szertípus szerinti megoszlás (N; %)



Egyéb stimuláns: MDMA; metilon; metamfetamin; ritalin; PPMC; fluoramfetamin; mefedron; „designer drog”

Injektálás kezdete és elsődlegesen injektált szertípus


N= 346



Utolsó injekció időpontja és elsődlegesen injektált szer típusa


N= 337

Az aktív injektálók 50%-a napi injektáló




HCV fertőzöttség és elsődlegesen injektált szertípus


N= 332



Fecskendő megosztás az elmúlt 4 hétben és elsődlegesen injektált szertípus az aktív injektálók körében



Segédeszköz megosztás az elmúlt 4 hétben és elsődlegesen injektált szertípus az aktív injektálók körében



■ megosztotta ■ nem osztotta meg

Napi injektálás-szám (utolsó napon, amikor szúrt)

Szertípus	Átlag	N	Szórás	Minimum	Maximum
4-MEC	11,50	4	8,10	1	20
pentakristály	5,33	24	5,09	1	20
egyéb stimuláns	4,73	15	3,79	1	15
kokain	4,50	4	3,70	2	10
MDPV	4,33	9	3,04	2	10
amfetamin	4,30	79	5,53	1	30
opiát	2,68	130	2,56	1	20

Újrahasználások száma (utolsó fecskendő esetében)

Szertípus	Átlag	N	Szórás	Minimum	Maximum
MDPV	4,93	14	5,05	1	20
egyéb stimuláns	4,08	13	7,93	0	30
pentakristály	3,50	22	2,43	1	10
4-MEC	3,00	4	1,83	1	5
kokain	2,80	5	4,38	0	10
amfetamin	2,61	90	3,43	0	20
Összesen	2,46	301	3,31	0	30
opiát	1,82	153	2,19	0	14

- Hány személytől kapott használt fecskendőt az elmúlt 4 hétben? (N=151)

0	60,9%
1	17,9%
≥ 2	21,2%

- 31,4% volt már valaha börtönben (N=370)
- 10% járt több mint egy tőcsere programban az elmúlt 4 hétben (N=309)
- 31,2% vásárolt tűt gyógyszertárban az elmúlt 4 hétben (N=368)

Köszönöm a figyelmet!

Tarján Anna

Tarjan.anna@oek.antsz.hu

www.drogfokuszpont.hu