

Az intravénás kábítószer-használók HIV,
HBV, HCV prevalenciája a 2011-es
keresztmetszeti vizsgálat alapján

Dr. Dudás Mária, Országos Epidemiológiai Központ, Járványügyi osztály

A 2011. év folyamán vizsgált intravénás kábitószer-használók HIV, HCV, HBV fertőzöttsége korcsoportok szerint

Korcsoport		HIV ellenanyag jelenlétére vizsgált személyek		HBsAg antigén jelenlétére vizsgált személyek			HCV ellenanyag jelenlétére vizsgált személyek		
		száma	közül pozitív	száma	közül pozitív		száma	közül pozitív	
					szám	%		Szám	%
< 25 év	férfi	81	0	81	0	0,0	80	17	21,3
	nő	39	0	39	0	0,0	38	6	15,8
25-34 év	férfi	253	0	252	0	0,0	249	54	21,7
	nő	81	0	80	1	1,3	80	26	32,5
> 34 év	férfi	147	0	147	1	0,7	143	32	22,4
	nő	65	0	65	1	1,5	62	22	35,5
Összesen	férfi	481	0	480	1	0,2	472	103	21,8
	nő	185	0	184	2	1,1	180	54	30
	ffi+nő	666	0	664	3	0,5	652	157	24



**A HCV, HBV pozitív intravénás kábítószer-használók
megoszlása
az intravénás kábítószer-használat kezdete szerint, 2011**

Az intravénás kábitószer- használat kezdete	HBsAg antigén jelenlétére vizsgált személyek			HCV ellenanyag jelenlétére vizsgált személyek		
	szám a	közül pozitív		száma	közül pozitív	
		szám	%		szám	%
< 2 év	67	0	0,0	67	7	10,4
2 - 4 év	85	0	0,0	85	10	11,8
5 - 9 év	131	0	0,0	128	43	33,6
10 évnél régebben	367	3	0,8	359	96	26,7
Nem tudja	14	0	0,0	13	1	7,7
Összesen	664	3	0,5	652	157	24

A HCV, HBV pozitív intravénás kábítószer- használók megoszlása az utolsó injektlás időpontja szerint, 2011

Az utolsó injektlás időpontja	HBsAg antigén jelenlétére vizsgált személyek			HCV ellenanyag jelenlétére vizsgált személyek		
	száma	közül pozitív		száma	közül pozitív	
		szám	%		szám	%
< 4 hét	398	2	0,5	390	128	32,8
4 hét-1 év	132	1	0,8	129	14	10,9
> 1év	123	0	0,0	122	12	9,8
Nem tudja	11	0	0,0	11	3	27,3
Összesen	664	3	0,5	652	157	24

A HBV és a HCV szűrővizsgálatok száma és a pozitívak aránya területenként, 2011

Terület/város	HBsAg antigén jelenlétére vizsgált személyek			HCV ellenanyag jelenlétére vizsgált személyek		
	száma	közül pozitív		száma	közül pozitív	
		szám	%		szám	%
Budapest	390	3	0,8	380	130	34,2
Szeged	60	0	0,0	60	12	20
Pécs	60	0	0,0	60	4	6,7
Miskolc	35	0	0,0	34	1	2,9
Gyula	15	0	0,0	15	0	0,0
Kecskemét	15	0	0,0	15	0	0,0
Szekszárd	8	0	0,0	8	0	0,0
Eger	15	0	0,0	15	3	20
Veszprém	20	0	0,0	19	2	10,5
Debrecen	40	0	0,0	40	4	10
Salgótarján	6	0	0,0	6	1	16,7
Vidék összesen	274	0	0,0	272	27	9,9
Együtt	664	3	0,5	652	157	24

A HCV, HBV pozitív intravénás kábítószer- használók megoszlása az elsődlegesen injektált kábitószer típusa szerint, 2011

Kábítószer típusa	HBsAg antigén jelenlétére vizsgált személyek			HCV ellenanyag jelenlétére vizsgált személyek		
	száma	közül pozitív		száma	közül pozitív	
		szám	%		szám	%
Opiát	326	1	0,3	321	55	17,1
Amfetamin	262	2	0,8	257	77	30
Kokain	8	0	0,0	8	3	37,5
Egyéb	68	0	0,0	66	22	33,3
Együtt	664	3	0,5	652	157	24


Ha az elsődlegesen injektált kábítószer
típusa: egyéb....(68 esetben)

- ▶ Mefedron (36) 38%-uk anti HCV pozitív
- ▶ MDPV (16) 6%-uk anti HCV pozitív
- ▶ Methadon (6)
- ▶ MP4 (4)
- ▶ Mp3 (1)
- ▶ Pervitin (2)
- ▶ Rivotril (2)
- ▶ NA (1)



HIV szűrővizsgálatra vonatkozó kérdések

- ▶ A kliensek kétharmadánál már történt HIV szűrővizsgálat.



Több mint 90%-uk tudta, hogy HIV negatív

Egyharmaduknál 2010-ben
Egyharmaduknál 2009-ben történt HIV szűrővizsgálat utoljára



A vizsgálatba bevontak több mint felénél egyáltalán nem történt HIV szűrővizsgálat, vagy az utolsó HIV szűrővizsgálat két évnél régebben volt.



HCV szűrővizsgálatra vonatkozó kérdések (1)

- ▶ A kliensek 70%-ánál már történt HCV szűrővizsgálat.



Egyharmaduknál 2010-ben
Egyharmaduknál 2009-ben történt HCV
szűrővizsgálat utoljára



**A vizsgálatba bevontak több mint felénél
egyáltalán nem történt HCV
szűrővizsgálat,
vagy az utolsó HCV szűrővizsgálat két
évnél régebben volt.**



HCV szűrővizsgálatra vonatkozó kérdések (2)

- ▶ A HCV szűrővizsgálaton részt vett kliensek 80%-a (375 fő) negatívnak vallotta magát HCV-re nézve.



Azonban 16%-uk (59 fő) HCV ellenanyag pozitívnak bizonyult.

62 fő vallotta magát HCV pozitívnak, 53 főnél ez bizonyítást is nyert.

(32-en azt is tudták, hogy mikor szereztek tudomást a fertőződésükről)

Azoknak, akik voltak szűrővizsgálaton, de nem tudták a szerostátuszukat, 40%-a volt HCV ellenanyag pozitív.

